

# 学校感染症について

<第1種> 治癒するまで出席停止

エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス

<第2種>

| 病名                  | 出席停止  | 症状   | 経路       | 潜伏期間   | 伝染可能期間             |
|---------------------|---|--|----------|--------|--------------------|
| インフルエンザ             | 発症後5日が経過しかつ解熱後2日を経過するまで                       | 発熱、頭痛関節痛、全身倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み                  | 飛沫       | 1～3日   | 発病後 3～4日           |
| 百日咳                 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌物質製剤による治療が終了するまで       | コンコンという短く激しい咳が続く                           | 飛沫       | 1～2週間  | 発病後 28日            |
| 麻疹<br>(はしか)         | 解熱後3日を経過するまで                                  | 発熱、咳、鼻水、目やに、結膜充血、頬の内側に白点ができる、発熱後4日目より皮膚に発疹 | 飛沫<br>空気 | 10～12日 | 発疹の出る5日前～後4日       |
| 流行性耳下腺炎<br>(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過しかつ全身状態がりょうこうになるまで。 | 37～38℃の発熱片側から両側のあごの後ろが大きく腫れて痛む。食欲不振、嚥下困難   | 飛沫       | 1～2週間  | 発病後7日前から発病後9日      |
| 風疹<br>(3日はしか)       | 発疹が消失するまで                                     | 発熱、発疹、耳の後ろ、首脇の下が腫れる。咳、結膜の充血                | 飛沫       | 2～3週間  | 発疹のでる7日前からでた後の7日間  |
| 水痘<br>(水ぼうそう)       | 全ての発疹が痂皮化するまで                                 | 水疱のある発疹が体中に次々できかさぶたになる。                    | 飛沫       | 2～3週間  | 発疹のでる1日前からでた後の6～7日 |
| 咽頭結膜熱<br>(プール熱)     | 主症状が消失した後、2日を経過するまで                           | 発熱・のどの痛み・結膜の充血・首のリンパ節腫脹                    | 結膜<br>接触 | 5～7日   | 発病後2～3週            |
| 結核                  | 伝染のおそれなくなるまで                                  | 初期は自覚症状無し。疲労感、寝汗、体重減少、咳、痰                  | 飛沫       | 1～2ヶ月  |                    |
| 髄膜炎<br>細菌性髄膜炎       | 伝染のおそれなくなるまで                                  | 高熱・頭痛・おう吐                                  | 飛沫       | 2～5日   |                    |

<第3種>

| 病名              | 出席停止              | 症状                      | 経路          | 潜伏期間   | 伝染可能期間          |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 流行性角結膜炎         | 医師が伝染の恐れがないと認めるまで | 目の異物感、涙、目やに、充血          | 結膜接触<br>汚染物 | 5～7日   | 発病後2～3週間        |
| 急性出血性結膜炎        |                   | 目の痛み、充血、出血              | 結膜汚染物       | 1～2日   | 発病後5～7日         |
| O-157           |                   | 激しい腹痛、水様性の下痢、おう吐、吐き気    | 経口          | 3～8日   |                 |
| ヘルパンギーナ         |                   | 高熱、のどの痛み、発赤、のどの奥に小さな水疱疹 | 飛沫          | 2～7日   | 発病後2～3日         |
| 溶連菌感染症          |                   | 高熱、発疹、扁桃の腫脹発赤、のどの痛み     | 飛沫          | 2～5日   | 治療開始後24時間       |
| マイコプラズマ感染症      |                   | 発熱、乾性の激しい咳、のどの痛み        | 飛沫          | 2～3週間  | 急性期             |
| りんご病            |                   | 両頬に麻疹様様の発疹手足に網目状の紅斑     | 飛沫          | 10～20日 | 発疹がでる1～2週間前の数日間 |
| 手足口病            |                   | 軽い発熱、小さな水疱が口や手足にできる     | 飛沫          | 2～7日   | 症状のある間          |
| RSウイルス          |                   | 発熱、鼻水、咳、喘鳴              | 飛沫、接触       | 2～8日   | 症状前～3週間         |
| 感染性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症 |                   | 発熱、腹痛、下痢、おう吐            | 飛沫、経口       | 1～3日   | 症状がある間          |